



CLINIQUE DE HAUTE TECHNOLOGIE ORL
Dr. Pilar Jaimes-Lambert, U. René Descartes, Paris
La différence en Oto-rhino-laryngologie

OREILLE PERFORATION TYMPANIQUE

Description:	Orifice dans le tympan causant une perte d'audition et/ou saignement.
Est-ce une urgence?	Non, néanmoins on doit voir le patient dans les 48 heures suivantes, en cas d'une perforation traumatique par exemple, coup de poing ou pour la décompression, pour éviter une infection ou une perforation de tympan permanente.
Examen diagnostic à compléter :	Le diagnostic est confirmé par l'examen direct de l'oreille ou par une vidéo endoscopie de l'oreille. Une évaluation de l'audition mesure le degré de surdité causée par la perforation
Procédure à compléter en cabinet:	Vidéo endoscopie de l'oreille. Cette procédure consiste à visualiser avec l'endoscope l'emplacement précis et la taille de la perforation. Un nettoyage soigné pour enlever le sang ou des sécrétions est nécessaire. Il est pratiqué avec ou sans anesthésie locale selon l'âge et la collaboration du patient. Il est possible de combiner avec une Aspiration Instrumentale et / ou instillation d'antibiotiques.
Procédure à compléter au bloc opératoire :	La reconstruction chirurgicale de la perforation peut être nécessaire si le traitement médical n'a pas été efficace. Une greffe du patient est normalement utilisée.

PRIX *

Procédure	Prix en Dollars US *
Aspiration instrumentale et ou instillation d'antibiotique (code 423)	\$ 370

* Toute procédure est précédée par une Consultation Médicale (coût de 200 \$) afin de confirmer le diagnostic et offrir la meilleure option thérapeutique. Les honoraires de chirurgie n'incluent pas les dépenses d'anesthésie, les honoraires de la salle de chirurgie et tout médicament ou consommable utilisé lors de la chirurgie. Les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis.